

●予防接種の種類

予防接種名	対象年齢			接種回数		接種間隔	【標準的な接種間隔】	備考	
ロタ	【ロタリックス】 生後6週～生後24週			2回		4週間以上の間隔を置いて生後24週までに2回		初回接種を生後2か月から出生14週6日までに接種することが望ましい	
	【ロタテック】 生後6週～生後32週			3回		4週間以上の間隔を置いて生後32週までに3回			
ヒブ ※接種開始年齢によって、接種回数が異なります	生後2月～6月（5歳）の前日	接種開始年齢	生後2月～7月となる前日	初回	3回	1歳前日までに、27日以上【56日まで】の間隔を置いて3回		・初回接種を終了せずに1歳を超えた場合は、初回接種最後の注射から27日以上の間隔を置いて1回接種します。 ・『27日以上の間隔』は、医師が必要と認めた場合は20日から接種可能です。	
				追加	1回	初回3回終了から7月以上【13月まで】の間隔を置いて1回			
			生後7月～1歳となる前日	初回	2回	1歳前日までに、27日以上【56日まで】の間隔を置いて2回			
				追加	1回	初回2回終了から7月以上【13月まで】の間隔を置いて1回			
小児用肺炎球菌 ※接種開始年齢によって、接種回数が異なります	生後2月～6月（5歳）の前日	接種開始年齢	生後2月～7月となる前日	初回	3回	2歳【1歳】前日までに、27日以上の間隔を置いて3回		・1歳を超えて初回接種2回目を行った場合は、第3回目の接種は行いません。（追加接種は実施可能）	
				追加	1回	1歳前日以降に、初回3回終了から60日以上の間隔を置いて1回			
			生後7月～1歳となる前日	初回	2回	2歳【1歳】前日までに、27日以上の間隔を置いて2回		・初回2回目の接種は、2歳前日までにを行い、それを超えた場合は行いません。（追加接種は実施可能）	
				追加	1回	1歳前日以降に、初回2回終了から60日以上の間隔を置いて1回			
			1歳～2歳となる前日	2回		60日以上の間隔を置いて2回			
			2歳～5歳となる前日	1回					
B型肝炎	～生後1歳となる前日			3回		27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目から139日以上の間隔を置いて3回目接種			
5種混合 ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリ ヒブ	生後2か月～7歳6か月となる前日			第1期初回	3回	20日以上【56日】の間隔を置いて接種			
				追加	1回	第1期初回3回終了から、6月以上【18月】の間隔を置いて1回接種			
4種混合 ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ	生後2月～7歳6月となる前日			第1期初回	3回	20日以上【56日まで】の間隔を置いて3回			
				第1期追加	1回	第1期初回3回終了から、6月以上の間隔を置いて1回			
BCG	～生後1歳となる前日			1回					
水痘	1歳～3歳となる前日			2回		3月以上の間隔を置いて2回			
麻しん 風しん 混合	1歳～2歳となる前日			第1期	1回				
	就学前1年間にある児（年長児）			第2期	1回	※令和7年4月1日～令和8年3月31日の間に接種			
日本脳炎	生後6月～7歳6月となる前日			第1期初回	2回	6日以上【28日まで】の間隔を置いて2回			
				第1期追加	1回	第1期初回2回終了から、6月以上【概ね1年後】の間隔を置いて1回			
	9歳～13歳となる前日			第2期	1回				
2種混合 （ジフテリア・破傷風）	11歳～13歳となる前日			1回					
子宮頸がん	2価	サーバリックス	小学6年生～高校1年生相当の女子		3回		2回目：1回目接種から1月以上 3回目：1回目接種から5月【6月】以上、かつ2回目接種から2月半以上		・ワクチンは3種類あり、接種間隔が異なります ・接種開始のワクチンで接種完了します ○キャッチアップ対象者 ○定期接種最終学年 H9年4月2日～H21年4月1日生でR7年3月までに1回目を接種した方は、令和8年3月末まで残りの接種分を公費で接種できます。
	4価	ガーダシル					2回目：1回目接種から1月【2月】以上 3回目：2回目接種から3月【1回目接種から6月】以上		
	9価	シルガード9 ※R5.4月～	接種開始年齢	小6～15歳の誕生日前日	2回	2回目：1回目接種から5か月以上【6月】あける			
				15歳～高1	3回	2回目：1回目接種から1月【2月】以上 3回目：2回目接種から3月【1回目接種から6月】以上			

★スケジュールや接種間隔など、不明な点は気軽にご相談ください

【問い合わせ先】
上峰町役場 健康福祉課
☎0952-52-7413