

●予防接種の種類《令和8年度》

予防接種名	対象年齢	接種回数	接種間隔	【標準的な接種間隔】	備考	
ロタ	【ロタリックス】 生後6週～生後24週	2回	4週間以上の間隔を置いて生後24週までに2回		初回接種を生後2か月から出生14週6日までに接種することが望ましい	
	【ロタテック】 生後6週～生後32週	3回	4週間以上の間隔を置いて生後32週までに3回			
ヒブ ※接種開始年齢によって、接種回数が異なります	生後2月～60月（5歳）の 接種開始年齢	生後2月～7月となる前日	初回	3回	1歳前日までに、27日以上【56日まで】の間隔を置いて3回	・初回接種を終了せずに1歳を超えた場合は、初回接種最後の注射から27日以上の間隔を置いて1回接種します。 ・『27日以上の間隔』は、医師が必要と認めた場合は20日から接種可能です。
			追加	1回	初回3回終了から7月以上【13月まで】の間隔を置いて1回	
		生後7月～1歳となる前日	初回	2回	1歳前日までに、27日以上【56日まで】の間隔を置いて2回	
小児用肺炎球菌 ※接種開始年齢によって、接種回数が異なります	生後2月～60月（5歳）の 接種開始年齢	生後2月～7月となる前日	初回	3回	2歳【1歳】前日までに、27日以上の間隔を置いて3回	・1歳を超えて初回接種2回目を行った場合は、第3回目の接種は行いません。（追加接種は実施可能）
			追加	1回	1歳前日以降に、初回3回終了から60日以上の間隔を置いて1回	
		生後7月～1歳となる前日	初回	2回	2歳【1歳】前日までに、27日以上の間隔を置いて2回	・初回2回目の接種は、2歳前日までにを行い、それを超えた場合は行いません。（追加接種は実施可能）
			追加	1回	1歳前日以降に、初回2回終了から60日以上の間隔を置いて1回	
		1歳～2歳となる前日	2回		60日以上の間隔を置いて2回	
2歳～5歳となる前日	1回					
B型肝炎	～生後1歳となる前日	3回	27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目から139日以上の間隔を置いて3回目接種			
5種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリ ヒブ)	生後2か月～7歳6か月となる前日	第1期初回	3回	20日以上【56日】の間隔を置いて接種		
		追加	1回	第1期初回3回終了から、6月以上【18月】の間隔を置いて1回接種		
BCG	～生後1歳となる前日	1回				
水痘	1歳～3歳となる前日	2回	3月以上の間隔を置いて2回			
麻しん 風しん 混合	1歳～2歳となる前日	第1期	1回		・対象：令和2年4月2日～令和3年4月1日生の方	
	就学前1年間にある児（年長児）	第2期	1回	※令和8年4月1日～令和9年3月31日の間に接種		
日本脳炎	生後6月～7歳6月となる前日	第1期初回	2回	6日以上【28日まで】の間隔を置いて2回	平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者で20歳未満にある者については、予防接種実施規則附則第3条1項から第5項の規定により接種することとする。	
		第1期追加	1回	第1期初回2回終了から、6月以上【概ね1年後】の間隔を置いて1回		
	9歳～13歳となる前日	第2期	1回			
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳～13歳となる前日	1回				
子宮頸がん	接種開始年齢	小6～15歳の誕生日前日	2回	2回目：1回目接種から5か月以上【6月】あける	・令和8年4月よりワクチンの種類がシルガードのみとなっています	
		15歳～高1	3回	2回目：1回目接種から1月【2月】以上 3回目：2回目接種から3月【1回目接種から6月】以上		
RSウイルス	妊娠28週0日から36週6日まで	1回				

★スケジュールや接種間隔など、不明な点は気軽にご相談ください

【問い合わせ先】
上峰町役場 健康福祉課
☎0952-52-7413